

[illegible]

Opgave 1. Zij $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ de vrije Bernoulli-wandeling (met $S_0 \equiv 0$) met parameter p . We willen de verdeling $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ van de terugkeertijd van toestand 0 bepalen zonder gebruik van de zuivere vernieuwingsvergelijking en van de basisrij (u_n) met $u_n := \mathbb{P}(S_n = 0)$. We doen dit, zoals in het wachtrij-probleem van Hoofdstuk VI-A, door uitsplitsing naar de waarden van S_1 . Zij $(g_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ de verdeling van de intreetijd van toestand 1 en $(\bar{g}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ die van toestand -1 . Noteer $q := 1 - p$.

- (i). Laat zien dat $f_1 = 0$ en $f_{m+1} = qg_m + p\bar{g}_m$ voor $m \in \mathbb{N}$.
- (ii). Laat zien dat $g_1 = p$ en $g_{m+1} = qg_m^*$ voor $m \in \mathbb{N}$, vertaal dit in termen van de gf G van (g_n) , en bepaal G door oplossing van de resulterende functionaalvergelijking.
- (iii). Wat is nu de gf $\bar{G}$ van $(\bar{g}_n)$? Antwoord volstaat.
- (iv). Bewijs met behulp van (i), (ii) en (iii) dat de gf F van (f_n) gegeven wordt door

$$F(z) = 1 - \sqrt{1 - 4pqz^2},$$

en bepaal hiermee een expliciete uitdrukking voor de terugkeerkansen f_n .

- (v). Laat met behulp van (iv) zien dat de wandeling voor geen enkele waarde van p positief-recurrent is.

Opgave 2. Zij $(X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ een Markov-keten met toestandsruimte I , startverdeling a en overgangsmatrix $\mathcal{P} = (p_{ij})$. Noteer $f_{aj} := \mathbb{P}_a(\tau_j < \infty)$, met τ_j de intreetijd van toestand j , en zij $N(j)$ het aantal bezoeken aan j :

$$N(j) := \#(\{n \in \mathbb{N} : X_n = j\}).$$

- (i). Bewijs met behulp van inductie en door uitsplitsing naar de waarden van τ_j dat

$$\mathbb{P}_a(N(j) \geq m) = f_{aj} (f_{jj})^{m-1} \quad [m \in \mathbb{N}].$$

- (ii). Welk kenmerk van (de verdeling van) $N(j)$ krijgen we als we in $\mathbb{P}_a(N(j) \geq m)$ de limiet nemen voor $m \rightarrow \infty$? En welk als we sommeren over $m \in \mathbb{N}$? Welk resultaat geeft (i) in elk der beide gevallen?

Beschouw verder het speciale geval waarbij $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $a = (\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, 0, 0)$, en $\mathcal{P}$ gegeven wordt door de matrix hiernaast.

- (iii). Laat, zonder bepaling van intreeverdelingen, zien dat $f_{a1} = \frac{1}{2}$, en bepaal met behulp hiervan en van (i) de kansverdeling van $N(1)$. Is $N(1)$ defectief?

- (iv). Laat zien dat de keten een limietverdeling heeft, en bepaal deze.

$$\begin{matrix} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Studievereniging STORM
De Boelelaan 1081
1081 HV AMSTERDAM
telefoon: 020 - 447666
e-mail: storm@cs.vu.nl

ZOZ

