


Tentamen basis wiskunde AI ; 16-12-1999 (Antwoorden)

1) a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -6 & -20 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -8 & -24 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} c_1 = 2 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = 3 \end{matrix}$$


- Dus $\vec{p} = 2\vec{a} - 1\vec{b} + 3\vec{c}$.
- b) $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ is lineair onafhankelijk, want bij de eliminatie in a is te zien dat de matrix met $\vec{a}, \vec{b}$ en $\vec{c}$ als kolommen drie spijkers heeft. Drie onafh. vectoren in $\mathbb{R}^3$ vormen basis!
- c) $\cos(\angle(\vec{b}, \vec{c})) = \frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{\|\vec{b}\| \|\vec{c}\|} = \frac{1}{\sqrt{5} \sqrt{5}} = \frac{1}{5}$; dus $\angle(\vec{b}, \vec{c}) \approx 78^\circ$.
- d) stel projectie $\vec{q} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ dan geldt $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda \end{bmatrix} \perp \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
 dus $\begin{pmatrix} 0-\lambda \\ -1-\lambda \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, dus $-\lambda - 1 - \lambda + 2 - \lambda = -3\lambda + 1 = 0$; $\lambda = \frac{1}{3}$
 conclusie $\vec{q} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$.

- 2) a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{1/5}{1 - 1/5} = \frac{1/5}{4/5} = \frac{1}{4}$
- b) Het is een MR met $r = \frac{2}{5}$; convergent als $-1 < \frac{2}{5} < 1$, dus als $-5 < x < 5$
- c) de sm is dan $\frac{1/5}{1 - x/5} = \frac{1}{5-x}$
 $\frac{1}{5-x} = 1$ dus $x = 4$.



- 3) a) $\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$; dus $\sin 2x \approx 2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!}$
 $2 \sin x \approx 2x - 2 * \frac{x^3}{3!} + 2 * \frac{x^5}{5!}$
 $\frac{2 \sin x - 2 \sin x}{2 \sin x} \approx -x^3 + \frac{1}{4} x^5$
- 4) $P(x) = \frac{100}{1 + 4e^{-0.2x}}$

- 5) a) $\int_1^e \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2} dx = \int_1^e (1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}) dx = [x + 3 \ln|x| + 4/x]_1^e = (e + 3 + 4/e) - (1 + 3 + 4) = e^3 + 4 + \frac{4}{e^3} - 8 = e^3 - 4 + \frac{4}{e^3}$
- b) $\int_1^e x^{1/2} \ln x dx = \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \ln x - \int \frac{2}{5} x^{3/2} \cdot \frac{1}{x} dx \right]_1^e = \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \ln x - \frac{4}{25} x^{5/2} \right]_1^e = \left[\frac{2}{5} e^{5/2} \ln e - \frac{4}{25} e^{5/2} \right] - \left[\frac{2}{5} \ln 1 - \frac{4}{25} \right] = \frac{2}{5} e^{5/2} - \frac{4}{25} e^{5/2} + \frac{4}{25} = \frac{6}{25} e^{5/2} + \frac{4}{25}$



- 5c) $\int_0^{1-x} (e^{-x} - x) dx = [-e^{-x} - \frac{1}{2} x^2]_0^{1-x} = (-e^{-1-x} - \frac{1}{2} (1-x)^2) - (-e^0 - 0) = -e^{-1-x} - \frac{1}{2} (1-x)^2 + 1$
- 6) a) voor elk punt (x, y) geldt $\text{grad}(x, y) = (-2)$
 helling vlak = $\tan \varphi = \|(-2)\| = \sqrt{5}$; dus $\varphi \approx 66^\circ$.
- b) helling in richting $(\vec{p})$ is: $\frac{(1, p) \cdot (-2)}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{1-2p}{\sqrt{1+p^2}}$
- Dus helling nul $\Leftrightarrow 1-2p = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$.
 Dus $1-4p+p^2 = 1-4(\frac{1}{2})+(\frac{1}{2})^2 = 1-2+0.25 = -0.75 < 0$
 Dus $p = \frac{1}{2}$ is het enige punt waar de helling nul is.
- 7) a) $f(x, y) = x^2 - x^2 y^2 + x$; $f(3, 2) = 9 - 12 + 3 = 0$
 $f_x(x, y) = 2x - y^2 + 1$; $f_x(3, 2) = 6 - 4 + 1 = 3$
 $f_y(x, y) = -2xy$; $f_y(3, 2) = -12$
 Hesse-matrix: $H = \begin{bmatrix} 2 & -4y \\ -4y & -2x \end{bmatrix}$ bij $(3, 2)$: $H = \begin{bmatrix} 2 & -8 \\ -8 & -6 \end{bmatrix}$
 Eigenwaarden: $\lambda^2 + 4\lambda - 10 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 40}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{56}}{2} = -2 \pm \sqrt{14}$
 Dus H is indefinit, dus $(3, 2)$ is geen lokaal extremum.
- b) $f_{xx}(x, y) = 2$; $f_{xy}(x, y) = -2y$; $f_{yy}(x, y) = -2x$
 Hesse-matrix bij $(0, 1)$: $H = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$
 Eigenwaarden: $\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2$
 Dus H is indefinit, dus $(0, 1)$ is geen lokaal extremum.

- 8) a) $\int_1^2 \int_3^4 (x-y) dx dy = \int_1^2 [\frac{1}{2} x^2 - yx]_{x=3}^{x=4} dy = \int_1^2 (2 - y) dy = [2y - \frac{1}{2} y^2]_1^2 = (4 - 2) - (2 - 0.5) = 2 - 1.5 = 0.5$
- b) $\int_0^2 \int_0^2 x^2 dx dy = \int_0^2 [\frac{1}{3} x^3]_{x=0}^{x=2} dy = \int_0^2 \frac{8}{3} dy = \frac{8}{3} [y]_0^2 = \frac{16}{3}$

